



FOLLETO DE INFORMACION AL PACIENTE

# Colpotrophine®

PROMESTRIENO  
Cápsulas Blandas Vaginales 10 mg

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo, pregunte a su médico o químico farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este medicamento corresponda exactamente al indicado por su médico.

## Composición:

Cada cápsula vaginal contiene:

Promestrieno: 10 mg

Excipientes: Metilparabeno, propilparabeno, petrolato blanco, poliisobuteno perhidrogenado, sorbitan sesquioleato, dióxido de silicio coloidal, agua purificada, gelatina, glicerol, dimeticona, cs.

## Indicaciones:

Promestrieno es usado vía vaginal para el tratamiento de los trastornos tróficos vulvovaginales.

## Contraindicaciones:

No debe ser usado en pacientes que presenten hipersensibilidad a alguno de los componentes de la formulación. No utilizar promestrieno en caso de antecedentes de cáncer estrógeno-dependiente. Sangramiento genital o uterino (anormal o no diagnosticado).

## Advertencias y Precauciones:

Úsese solo por indicación y bajo supervisión médica:

Este medicamento no debe ser administrado durante el embarazo ni la lactancia. Se requiere controles médicos durante el tratamiento: En caso de metrorragias, se recomienda una investigación etiológica. En caso de sangrado vaginal, consultar al médico.

No usar preservativos de látex por hasta 72 horas luego de las aplicaciones, dado que los aceites en la crema vaginal pueden debilitar los productos de látex.

**Interacciones con otros fármacos:**

Asociación contraindicada: Preservativos masculinos de látex.

Asociación no recomendada: Espermicidas.

**Efectos Adversos:**

El producto se reserva sólo para su uso vaginal. Solo menos del 1% de Promestrieno alcanza la circulación general sin efectos hormonales sistémicos. Muy raramente: Irritación, prurito local, posibilidad de alergia.

**Forma de Administración y Dosis:**

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiado a su caso particular, no obstante, la dosis usual recomendada es:

10 miligramos ,una cápsula al día. La vía de administración es vaginal.

Usar el medicamento al momento de acostarse para aumentar su efectividad.

La posología debe ser adaptada en función de la mejora obtenida.

**Sobredosis:**

Hasta el momento no ha sido reportada la repercusión clínica potencial asociada a la sobredosis del preparado.

**Condiciones de Almacenamiento:**

Mantener en su envase original y en lugar fresco y seco. Conservar a no más de 30 °C. No exponer al calor. No usar este medicamento después de la fecha de vencimiento indicada en el envase. No recomiende este medicamento a otra persona. No repetir el tratamiento sin consultar antes con el médico.

**NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN INDICACION MEDICA.  
NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA.  
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

D-ME-THER033-04  
IPS THX 3157  
M84104